

Protesi Fisse

Introduzione

L'impianto serve a sostituire uno o più denti mancanti, mettendo nel contempo al sicuro i denti sani. Decenni di ricerche scientifiche hanno confermato che gli impianti con base in titanio sono lo standard di eccellenza in termini di osteointegrazione.

Indicazioni

Tutti i pazienti che non hanno gravi malattie di salute e che non fumano possono sottoporsi a interventi di implantologia.

Intervento

Il primo passo è l'indagine radiologica: radiografie panoramiche e cone-beam CT consentono di valutare altezza, larghezza e densità dell'osso, fattori indispensabili per la buona riuscita dell'impianto.

L'intervento consiste nell'installazione dell'impianto nell'osso in anestesia locale. L'osteointegrazione impiega mediamente 3-4 mesi. Nel frattempo al paziente vengono forniti denti o protesi provvisori.

Dopo il processo di osteointegrazione, la fase successiva consiste nella lavorazione e nell'installazione della corona che viene cementata sull'impianto.

Indicazioni dopo l'intervento

Dopo l'intervento è opportuno applicare impacchi freddi per evitare la formazione di edemi ed ematomi. In presenza di dolori, quando l'effetto dell'anestesia è svanito, si può ricorrere ad antidolorifici.

È fondamentale poi il riposo: meglio evitare qualunque attività fisica intensa.





Health Croatia

www.healthcroatia.it